CIMOXANILO FOLPET COBRE

Fungicida orgánico formado por la combinación de tres materias activas especialmente eficaces en el control del mildiu de la vid. Permite una excelente acción de contacto, ya que al actuar sobre las esporas antes o en el momento de su germinación impide la penetración del hongo en los tejidos vegetales. Además, debido a su acción de sistemia local, se refuerza su acción preventiva ya que penetra en los tejidos de la planta e impide la penetración del micelio del hongo, pudiendo controlar la enfermedad durante los primeros días de la fase de incubación.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Vid de vinificación: mildiu.

Patata: mildiu y alternaria.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Vid de vinificación emplear a razón de 250-300 g/hl. En caso de utilizar maquinaria de atomización, aplicar de 1,5 a 2,5 kg/ha, según el desarrollo de la vegetación, con una dosis máxima de 1,5 kg Folpet/ha.

Patata aplicar a dosis de 2,5 kg/ha, con un caldo máximo de 500 l/ha.

En general, aplicar en pulverización normal procurando una distribución uniforme del producto.

RECOMENDACIONES

No mezclar con caldo bordelés, aceites minerales ni productos alcalinos. Entre la aplicación de un aceite y el producto o viceversa deben transcurrir 3 semanas.

Composición	Cimoxanilo 4% p/p (40 g/kg) Folpet 20% p/p (200 g/kg) Cobre 15% p/p (150 g/kg)
Formulación	Polvo Mojable (WP)
R.O.P.M.F. nº	21.404
Envasado	5 Kilos
Clasificación	Nocivo (Xn) Peligroso para el Medio Ambiente (N) Mamíferos: A Aves: A Peces: C Relativamente poco peligroso para las abejas

Debido a su contenido en cobre, en vid, no tratar durante la floración y tener precaución en tiempo frío y húmedo.

PLAZO DE SEGURIDAD

Patata: 15 días.

Vid de vinificación: 21 días.

R1